

2.4. JŪRAS KRAUKLIS — *Phalacrocorax carbo* (L.) — LATVIJAS IEKŠZEMES ŪDENSBASEINOS

Jūras krauklis Latvijā sastopams kā nelīdzdotājs nelielā skaitā jūrā, retāk — piejūras ezeros (Baumanis, Blūms, 1972). Atsevišķos gadījumos šī suga novērota arī iekšzemes ūdenbaseinos. Tā, Usmas ezerā viens īpatnis redzēts 1959. gada 6. aprīlī (A. Medņa mutisks ziņojums) un Lielauces ezerā 1963. gada 15. jūlijā (Виксне, 1967).

1978. gadā no 20. maija līdz 18. jūlijam (turpmākie novērojumi pārtraukti) viens līdz trīs šīs sugas īpatņi uzturējās Nagļu zivsaimniecības dīķos (Rēzeknes raj.).

Jāatzīmē, ka jūras kraukļa atsevišķu īpatņu vai baru uzturēšanas iekšzemes ūdenbaseinos pēdējā laikā novērota arī Lietuvas republikā (Валюс и др., 1976).

LITERATŪRA

Baumanis J., Blūms P. Latvijas putni. R., 1972.

Валюс М., Калиндрене Э., Пятрайтис А., Скуодис В. Исторические и современные материалы по орнитофауне Литовской ССР. Экология птиц Литовской ССР, I. Мат. орнит. исслед. в Литве, Вильнюс, 1976. с. 5—32. 35

Виксне Я. А. Новые встречи редких и залетных птиц в Латвии. Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. Тр. V Прибалт. орнитолог. конф., Таллин, 1967. с. 57—62.

J. Baumanis
LPSR ZA Bioloģijas institūts

Бауманис Я. Большой баклан — *Phalacrocorax carbo* (L.) — на внутренних водоемах Латвии.

Приводятся сведения о наблюдении 1—3 особей большого баклана с 20 мая до, по крайней мере, 18 июля 1978 г. на рыболовных прудах Нагли (восточная часть Латвии).